



CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 9

No. 153

PARA: DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIVEL PRIMARIO Y COMPLEMENTARIO, EAPB

DE: DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

ASUNTO: ACTUALIZACION DE LA DISPONIBILIDAD DE KITS DE ATENCIÓN DESDE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD DSR EN LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

FECHA: JUNIO 11 DE 2021

El Instituto Departamental de Salud de Nariño, como ente rector en el marco de las competencias legales teniendo en cuenta la Ley 715 de 2001, la ley 1122 de enero 9 de 2007, Resolución 459 de 2012, Resolución 3100 de 2019, Resolución 3280 de 2018, la Ley 1751 de 2015 y la Guía de Práctica Clínica para atención en VIH 2021 para atención pediátrica y para adultos. Imparte directrices para minimizar los riesgos en salud que se puedan presentar en la prestación de los servicios, por tanto se requiere contar con los siguientes kits de atención.



SC-CER98915



SC-CER98915

A continuación, se relacionan los medicamentos, insumos y dispositivos médicos que debe contener cada uno de los kits de atención, los cuales deben estar disponibles las 24 horas, recordando que es de **obligación de cumplimiento disponer de los mismos.**

KIT PARA LA TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS EN CASOS DE DELITOS SEXUALES

Insumo
Organizador plástico donde se encuentren todos los elementos para la recolección de evidencia forense
Bolsas de papel de diferentes tamaños o papel Kraft
Cortaúñas
Pinza de punta fina sin garra
Seda dental sin cera
Peinilla
Escobillones estériles con fragmentos de cinta de enmascarar que permita el rotulado
Para muestras de referencia
Fragmentos estériles de tela Garza de 2.5 X 2.5 cm, Copas plásticas desechables pequeñas + Lancetas
Tubos tipo vacutainer tapa lila (con EDTA)
Escobillones estériles para toma de saliva, tubo tapa roja
Tarjetas FTA + lancetas
Tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (fluoruro de sodio/oxalato de potasio)





CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 2 de 9

Tubo seco tapa roja
Agujas hipodérmicas para toma de sangre adaptables al sistema de vacío
Camisa para toma de muestras de sangre, adaptable al sistema de vacío
Torniquete
Lancetas estériles No 2 para toma de muestra de sangre del pulpejo del dedo
Frascos de polipropileno como mínimo de 20ml, con boca ancha y tapa rosca hermética. Sin preservativos
Cinta adhesiva transparente
Rótulos autoadhesivos pre-impresos para Elementos Material Probatorio EMP- Evidencias Físicas-EF, cadenas de custodia y formato valoración médico legal
Hojas de medio pliego de papel bond blanco
Marcador de punta fina indeleble
Gasas estériles
Caja secadora de escobillones
Agua destilada estéril
Tijeras
Bolsas plásticas transparentes de diferentes tamaños. Pequeñas 10x12cm aproximadamente, Medianas 16x21 cm aproximadamente, Grande 30x42 cm aproximadamente y para escobillones
Alcohol antiséptico con frasco lavador de 4cm de diámetro y 14 cm de alto.
Lupa mediana
Se ha socializado la circular y se cuenta con el protocolo en el servicio de urgencias



SC-CER98915



CO-SC-CER98915

KIT PARA ATENCION A VICTIMAS EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL/PROFILAXIS POST-EXPOSICION MENORES DE 13 AÑOS

Materiales e insumos	Cantidad
Pruebas rápidas para VIH con sensibilidad y especificidad mayor o igual al 99.5% + solución diluyente	2
Pruebas rápidas de Sífilis + solución diluyente (Se recomienda pruebas duales VIH/Sífilis para simplificar la logística y la aplicación del protocolo). Sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%	2
Pruebas rápidas de embarazo	2
Pruebas rápidas para Antígeno de superficie de Hepatitis B + solución diluyente. Sensibilidad mayor o igual al 95%, y especificidad igual o mayor al 99.5%	2
Pruebas rápidas para anticuerpos contra el VHC + solución diluyente. Sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%.	2
Lancetas	10
Micropipetas para recolección de muestras de sangre total por punción capilar para las pruebas rápidas de VIH, Hepatitis B, Sífilis, Hepatitis C y embarazo.	10
Rotulador permanente para pruebas rápidas.	1





CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 3 de 9

Profilaxis de la Hepatitis B: Vacuna contra la Hepatitis B y Gammaglobulina contra Hepatitis B.	2
Formatos de control de inventario y de fecha de vencimiento	
Formatos de reporte de interpretación de las pruebas rápidas	
Anticoncepción de emergencia: Para mujeres que consultan antes de las 72 horas posteriores a la exposición: Progestina sintética de segunda generación 2 tabletas Levonorgestrel 1.5 mg (2 tabletas x 0.75 mg). Para los casos de mujeres que consulten entre las 72 horas y las 120 horas desde ocurrida la exposición: Progestina sintética (levonorgestrel en igual dosis) + aplicación in situ de 1 Dispositivo intra-uterino (DIU).	

PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN AL VIH Y LAS ITS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 14 DÍAS Y MENORES DE 13 AÑOS

Profilaxis post exposición del VIH: El servicio de salud que atienda la urgencia e inicie la profilaxis del VIH, debe en todos los casos entregar al alta del paciente, el total de las dosis necesarias para completar 30 días de tratamiento profiláctico.

Recomendaciones previas antes de iniciar la profilaxis	Medicamento	Presentación y dosis
En niños y niñas de 14 días y menores de 13 años, se recomienda profilaxis ante la exposición de riesgo al VIH, el uso de Zidovudina, Lamivudina y Lopinavir-rtv.	Zidovudina: Suspensión 10 mg/ml. Tabletas de 100 y 300 mg	<ul style="list-style-type: none"> De 4 a 9 kg de peso: 12 mg/Kg cada 12 horas x 30 días. De 9 a 30 kg de peso: 9 mg/Kg cada 12 horas x 30 días. Peso mayor o igual a 30 Kg: 300 mg cada 12 horas x 30 días.
En niños y niñas menores de 3 años se recomienda profilaxis ante la exposición de riesgo al VIH en presentaciones en suspensión.	Lamivudina: Solución oral 10 mg/ ml. Tableta x 150 mg x 30 días.	<ul style="list-style-type: none"> 4 mg / Kg de peso cada 12 horas x 30 días Niños de 14 a 21 kilos: 1/2 tableta (75 mg) cada 12 horas. Dosis total 150 mg x 30 días Niños Mayores de 21 y menor de 30 kilos: 1/2 tableta (75 mg) am y 1 tableta (150 mg) pm. Dosis total 225 mg x 30 días. Mayor o igual a 30 kilos 1 tableta (150 mg) cada 12 horas. Dosis total 300 mg x 30 días
En niños y niñas mayores de 3 años se recomienda tabletas masticables de Lopinavir/Ritonavir (LPVrtv).	Lopinavir/ritonavir: Solución oral: 400/100 mg/5 ml. Tabletas x 100/25 y 200/50 mg.	<ul style="list-style-type: none"> Mayores de 14 días a 12 meses de edad: 300/75 mg/m² de área de superficie corporal por dosis cada 12 horas x 30 días. Mayores de 12 meses a 18 años de edad: 230/57,5 mg/m² de área de superficie corporal por dosis cada 12 horas x 30 días



SC-CER98915



SC-CER98915





CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 4 de 9

		<ul style="list-style-type: none"> • 15 a 20 Kilos: 2 tabletas de 100/25, cada 12 horas x 30 días; • >20 a 25 Kilos: 3 tabletas de 100/25 cada 12 horas x 30 días; • >30 a 35 Kilos: 4 tabletas de 100/25 cada 12 horas x 30 días; Se aclara que 4 tabletas de LPV/r x 100/25 mg pueden ser sustituidas por 2 tabletas de 200/50 mg teniendo en cuenta que estas últimas son más grandes y difíciles de ingerir.
<p>En caso de anemia o intolerancia al Lopinavir/Ritonavir/: se debe cambiar Zidovudina por Abacavir.</p>	<p>Abacavir: Solución oral 20 mg/ ml. Tableta x 300mg.</p> <p>No aprobada para uso en menores de 3 meses de edad.</p>	<p>Solución oral: 8 mg/ Kg (máximo 300 mg al día) cada 12 horas x 30 días.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De 14 a 21 Kilos: 1/2 tableta (150 mg) cada 12 horas. (Dosis total 300 mg) x 30 días. • Mayor de 21 y menor de 30 Kilos: 1/2 tableta (150 mg) am y 1 tableta (300 mg) pm (Dosis total 450 mg) x 30 días. • Mayor o igual a 30 Kilos: 1 tableta (300 mg) cada 12 horas (Dosis total 600 mg.) x 30 días.
<p>En niños de 3 años y menores de 13 años, en caso de intolerancia a Lopinavir/Ritonavir, se recomienda el uso de Raltegravir en tableas masticables.</p>	<p>Raltegravir: Tabletillas masticables x 25 y 100 mg. Tableta recubierta de 400 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Neonatos: no está aprobado su uso en neonatos. • De 10 a 14 Kg de peso: 75 mg cada 12 horas (3 cápsulas por 25 mg. masticables) x 30 días. • De 14 a 19 Kilos: 100 mg cada 12 horas (1 cápsula por 100 mg masticables) x 30 días. • De 20 a 27 Kilos: 150 mg cada 12 horas (1,5 cápsulas por 100 mg masticables) x 30 días. • De 28 a 39 Kilos: 200 mg cada 12 horas (2 cápsulas por 100 mg masticables) x 30 días. • Mayor o igual a 40 Kilos: 300 mg cada 12 horas (3 cápsulas por 100 mg masticables) x 30 días.



SC-CER98915



CO-SC-CER98915





CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 5 de 9

	<ul style="list-style-type: none"> Pacientes a partir de los 12 años de edad: tableta recubierta por 400 mg cada 12 horas x 30 días.
--	---

PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN A LAS ITS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 14 DÍAS Y MENORES DE 13 AÑOS	
Medicamento	Presentación y dosis
Ceftriaxona 500 mg. (1 ampolla)	Ceftriaxona Amp. 500 mg En menores de 12 años 50mg/kg dosis única Mayores de 12 años 1 ampolla dosis única
Metronidazol 2 gr.	Metronidazol Suspensión 250mg x 5cc Fco.x120 ml. 20 mg/Kg dosis única
Azitromicina 1 gr. (2 tabletas)	Azitromicina Suspensión 200mg x 5cc., Fco.x15ml. 10 mg/Kg dosis única.



SC-CER98915

KIT PARA ATENCION A VICTIMAS EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL/PROFILAXIS POST-EXPOSICION MAYORES DE 13 AÑOS Y GESTANTES



Materiales e insumos	Cantidad
Pruebas rápidas para VIH con sensibilidad y especificidad mayor o igual al 99.5% + solución diluyente	2
Pruebas rápidas de Sífilis + solución diluyente (Se recomienda pruebas duales VIH/Sífilis para simplificar la logística y la aplicación del protocolo). Sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%	2
Pruebas rápidas de embarazo	2
Pruebas rápidas para Antígeno de superficie de Hepatitis B + solución diluyente. Sensibilidad mayor o igual al 95%, y especificidad igual o mayor al 99.5%	2
Pruebas rápidas para anticuerpos contra el VHC + solución diluyente. Sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%.	2
Lancetas	10
Micropipetas para recolección de muestras de sangre total por punción capilar para las pruebas rápidas de VIH, Hepatitis B, Sífilis, Hepatitis C y embarazo.	10
Rotulador permanente para pruebas rápidas.	1
Profilaxis de la Hepatitis B: Vacuna contra la Hepatitis B y Gammaglobulina contra Hepatitis B.	2
Formatos de control de inventario y de fecha de vencimiento	
Formatos de reporte de interpretación de las pruebas rápidas	
Anticoncepción de emergencia: Para mujeres que consultan antes de las 72 horas posteriores a la exposición: Progestina sintética de segunda generación 2 tabletas Levonorgestrel 1.5 mg (2 tabletas x 0.75 mg).	

CO-SC-CER98915



CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 6 de 9

Para los casos de mujeres que consulten entre las 72 horas y las 120 horas desde ocurrida la exposición: Progestina sintética (levonorgestrel en igual dosis) + aplicación in situ de 1 Dispositivo intra-uterino (DIU).

PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN AL VIH Y LAS ITS EN MAYORES DE 13 AÑOS Y GESTANTES

Profilaxis post exposición del VIH: El servicio de salud que atienda la urgencia e inicie la profilaxis del VIH, debe en todos los casos entregar al alta del paciente, el total de las dosis necesarias para completar 30 días de tratamiento profiláctico.

Medicamento	Presentación y dosis
Primera opción: Tenofovir Diproxil Fumarato / emtricitabina y Dolutegravir	Tenofovir Diproxil Fumarato / emtricitabina – tabletas x 300 / 200 -1 al día x 30 días. Dolutegravir – tab x 50 mg 1 al día x 30 días.
Segunda opción: Tenofovir Diproxil Fumarato / emtricitabina y Darunavir / ritonavir	Darunavir / Ritonavir – tab x 800/ 100 mg 1 al día x 30 días.
Alternativa: Tenofovir Diproxil Fumarato / emtricitabina y Atazanavir / ritonavir	Atazanavir – tab x 300mg 1 tab día por 30 días Ritonavir tab x 100mg 1 tab día por 30 días



SC-CER98915

PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN A LAS ITS EN MAYORES DE 13 AÑOS Y GESTANTES

Medicamento	Presentación y dosis
Ceftriaxona 500 mg. (1 ampolla)	Ceftriaxona Amp. 500mg dosis única
Metronidazol 2 gr.	Metronidazol x 500mg Administrar 2 g (4 tab)
Azitromicina 1 gr. (2 tabletas)	Azitromicina 1 g Administrar 1 g (2 tab)
En caso de tratarse de una mujer gestante, se debe adicionar a la Ceftriaxona, el Metronidazol y a la Azitromicina, Penicilina Benzatínica 2'400.000 Unidades dosis única	En Gestantes: Penicilina Benzatínica IM x 2.400.000 UI. En caso de antecedente de alergia a la Penicilina, se debe proceder a desensibilizar, según las indicaciones de la Guía de Práctica clínica para Sífilis gestacional y congénita.



CO-SC-CER98915

KIT PARA LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA TRANSMISION MATERNO INFANTIL DEL VIH

Medicamento/insumos	Presentación y dosis	Cantidad
Zidovudina ampollas	Ampollas para infusión IV 10mg/ml Aplicar para la gestante (3 horas antes de cesárea o parto) vía endovenoso 2 mg / kilo por una hora, luego 1 mg / kilo por dos horas como mantenimiento.	2 ampollas por paciente

www.idsn.gov.co

Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bombona San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7233901

COMPROMETIDOS CON SU BIENESTAR



@EnlázateIDSN



CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 7 de 9

Pruebas rápidas para VIH	De las cuales una de ellas debe ser de cuarta generación	2 Pruebas Rápidas
Tubo con EDTA tapa lila	Carga viral para VIH (ARN): Tomar la muestra de sangre en dos tubos con EDTA (Tapa lila). Plasma: 2mL por cada tubo. Centrifugar por 20 minutos a 3000 rpm, separar el plasma de cada uno por aparte en tubos plásticos y congelar inmediatamente (hielo seco). Remitir congeladas las dos alícuotas (triple embalaje).	2 tubos tapa lila
Zidovudina jarabe	Zidovudina jarabe 10mg/ml: Prematuros (Entre 30 semanas y menor de 35 semanas): 2 mg/kilo/dosis Vía Oral cada 12 horas (Entre 35 semanas a 37 semanas): 4 mg/kilo/dosis Vía Oral cada 12 horas. A término (mayores de 37 semanas): dosis: 4 mg/kilo/dosis Vía Oral cada 12 horas.	1 frasco por paciente
Lamivudina jarabe	Lamivudina jarabe 10mg/ml: Prematuros (mayores de 32 semanas) y a término: 2 mg/kilo/dosis Vía Oral cada 12 horas.	1 frasco por paciente
Nevirapina jarabe	Nevirapina jarabe 10mg/ml: solo aplica para neonatos de alto riesgo: A término: 6mg/kilo/dosis VO cada 12 horas. Prematuros (mayor de 34 semanas): 4 mg/kilo/dosis VO cada 12 horas.	1 frasco por paciente
Raltegravir granulado	Raltegravir granulado para suspensión oral: 100mg/10ml de agua): Mayores de 37 semanas: 1.5 mg/kilo / dosis VO desde el nacimiento y durante la primera semana de vida dosis VO una vez al día, luego 3mg/kilo/dosis VO desde la 1 semana hasta la semana 4 de vida dosis dos veces al día.	30 sachets por paciente
Latas de formula láctea	Latas de formula láctea	2 latas por paciente
Cabergolina	Cabergolina tabletas 0.5mg: 1 mg (dos tabletas) dosis única el primer día posparto.	2 tabletas por paciente
Evidencia de la socialización de las Guías de Practica Clínica en VIH pediátrica y de adultos, además de la presente circular y se cuenta con el protocolo en el servicio.		



SC-CER98915



CO-SC-CER98915

KIT DE EMERGENCIA OBSTETRICA

ITEM	INSUMO/CANTIDAD
1	Cinco Angiocat N° 16
2	Cinco Angiocat N° 18
3	Cinco Macrogoteo
4	Cinco Microgoteo
5	Diez Solución Hartman de 500ml

www.idsn.gov.co

Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bomboná San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7233390 - 7233051 - 7233284 - 7298125

COMPROMETIDOS CON SU BIENESTAR



Instituto Departamental de Salud de Nariño



@EnlázateIDSN



CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 8 de 9

6	Diez Solución Salina de 500ml (10)
7	Veinte ampollas Sulfato de Magnesio ampollas x 2gr
8	Dos ampollas Labetalol Frasco x 100mg
9	Una ampolla por 20 mg Hidralazina
10	Nifedipino tabletas o cápsulas x 10mg (1 caja)
11	Nifedipino tabletas o cápsulas x 30 mg (1 caja)
12	Veinte ampollas Oxitocina
13	Cinco ampollas Metilergonovina ampolla x 0.2 miligramos
14	Un frasco Misoprostol tabletas 200 microgramos (28 tabletas)
15	Cuatro ampollas Ampicilina/sulbactam x 1 gramo
16	Seis ampollas Betametasona x 4mg
17	Dos ampollas Gluconato de Calcio al 10% ampollas por 10 ml
18	Balón de Bakri o balón de Belfort Dild o Balón Guardián para hemorragia posparto o condón, seda trenzada y sonda de Nelaton #14 con equipo de venoclisis
19	Traje antichoque no neumático
20	Se ha socializado la circular y se cuenta con el protocolo en el servicio



SC-CER98915

KIT DE EMERGENCIAS QUÍMICAS-ATAQUE POR ÁCIDO

ITEM	INSUMO/CANTIDAD
1	Guantes: Material: nitrilo Densidad: capa de 15 mil milésimas de pulgada de nitrilo y 13" de longitud. AQL mejorado 0,65 vs. 1,5, (mejor calidad y menos fugas). Pictograma de protección contra microorganismos, con el nivel 3. Nivel 4 en resistencia a la abrasión, 1 en resistencia al corte, 0 en resistencia al rasgado y 1 en resistencia a la punción.
2	Gafas de protección industrial
3	Pinza para recoger el cabello
4	Cintas de banda medidora de PH y tabla de lectura
5	Sobres de papel
6	Tijeras
7	Papel absorbente/toallas de mano
8	Bata desechable
9	Agua en bolsa, botella o garrafa
10	Clorhexidina en solución acuosa, al 0.2% de 500 ml o frascos de jabón líquido de tocador o jabón syndet de 250 cc.
11	Papel Kraft pliego de 115 gr de 80x110 cm
12	Bolsas plásticas transparente (una pequeña y una grande)
13	Bolsas plásticas negra
14	Marcador indeleble
15	Rótulo
16	Se ha socializado la circular y se cuenta con el protocolo en el servicio de urgencias



CO-SC-CER98915

www.idsn.gov.coCalle 15 N° 28-41 Plazuela de Bombona San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7235901 - 7235902 - 7235903 - 7235904 - 7235905

COMPROMETIDOS CON SU BIENESTAR



@EnlázateIDSN



CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 9 de 9

KIT PARA IVE CON MEDICAMENTOS

Medicamentos y suministros	Dosis
Misoprostol tabletas por 200 mcg	800 mcg
Mifepristona 200 mg	1 tab vía oral. Dosis única
Ibuprofeno por 400 mg	800 mg antes del misoprostol y luego una toma de 400 mg cada 3 a 4 horas (10 tabletas)

Los kits deben estar dispuestos en todas las prestadoras de servicios de salud que cuenten con servicio de urgencias y que atiendan gestantes en sala de partos, urgencias y hospitalización. En caso de ser utilizado un kit de emergencia, este debe ser repuesto de manera inmediata por el servicio farmacéutico de la IPS.

El Instituto Departamental de Salud de Nariño, a través de su equipo de IVC, en todos los municipios del departamento realizará seguimiento estricto a la disponibilidad de estos kits de emergencia. El no cumplimiento acarreará el respectivo proceso administrativo sancionatorio.








DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
 Directora IDSN



SC-CER98915



CC-SC-CER98915

PROYECTO: LILIANA ORTIZ CORAL - DIMENSIÓN SEXUALIDAD – DSDR		REVISÓ: DANIANA MARITZA DE LA CRUZ	
		SUBDIRECTORA DE SALUD PUBLICA IDSN	
Firmas	Fecha: 11 de junio de 2021	Firma	Fecha: 11 de junio de 2021
			
PROYECTO: CARMEN E. QUIÑONEZ - DIMENSIÓN SEXUALIDAD – DSDR			
Firmas	Fecha: 11 de junio de 2021		
			
PROYECTO: SUSAN MONCAYO – OFICINA MEDICAMENTOS			
Firmas	Fecha: 11 de junio de 2021		
			
PROYECTO: MARIO CAMPAÑA Profesional Especializado SCA		KAREN LUNA	
		SUBDIRECTORA CALIDAD Y ASEGURAMIENTO	
Firmas	Fecha: 11 de junio de 2021	Firma	Fecha: 11 de junio de 2021
			

COMPROMETIDOS CON SU BIENESTAR

www.idsn.gov.co

Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bomboná San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
 Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031 - 7293284 - 7296125



@EnlázateIDSN