

HERRAMIENTA DE RECONOCIMIENTO DE SEPSIS SEVERA & GUIA DE RESUSCITACION INICIAL

1. Todos los pacientes deben tener SCORE MATERNO DE ALERTA TEMPRANA
2. Todo paciente con SCORE > 4 debe ser tamizado para sepsis severa y ser evaluado por un médico en < 30 min
3. Si el paciente tiene sepsis severa se debe iniciar guía de resucitación.

SEPSIS: evidencia o sospecha clínica de infección + 1 o más de los siguientes criterios:

- Temperatura > 38°C ò < 36°C
- Taquicardia > 90/ min
- Frecuencia respiratoria > 20/ min
- Leucocitos > 12000/ mm³ ò < 4000 mm³

SEPSIS SEVERA: sepsis + disfunción de órgano, pe: hipotensión, oliguria, hipoxemia, acidosis metabólica, anormalidades de coagulación, alteración estado de consciencia.

1. Tiene el paciente SCORE > 4	SI / NO
2. La historia del paciente sugiere infección reciente: <ul style="list-style-type: none"> • Neumonía • Infección abdominopèlvica • Infección urinaria • Corioamnionitis • Meningitis • Infección tejidos blandos • Infección huesos o articulaciones 	SI / NO
3. Tiene el paciente 1 o más de los siguientes signos: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura > 38°C ò < 36°C • Escalofrío • Taquicardia > 90 • Frecuencia respiratoria > 20 • PAM < 65 mmHg 	SI / NO
Si usted contestó SI 2 ò 3 veces y el paciente tiene un SCORE > 4: Contacte un médico para que el paciente sea evaluado en 30 min y se inicien las “6 horas” de resucitación en sepsis	