

Plan Estratégico
Para la Expansión y el Fortalecimiento
de la Estrategia Alto a la TB

Pasto Libre de Tuberculosis



MUNICIPALIDAD DE PASTO





ALCALDÍA DE PASTO





ALCALDÍA DE PASTO

SECRETARÍA DE SALUD

Salud Pública

TUBERCULOSIS - LEPRA

SALUD PÚBLICA

PRIORIDAD

Tuberculosis - Lepra



Alexander Caicedo Martínez
Coordinador Prioridad Tuberculosis y Lepra
Esp. Gerencia en Promoción y Prevención
Universidad Mariana

Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.





ALCALDÍA DE PASTO

i

SITUACION Y COMPORTAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2013

Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.


Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



ALCALDÍA DE PASTO



CASOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DE PASTO AÑO_2013





ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE	INDICADOR	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicador de Captación SR	No. SR examinados con BK esputo / No SR programados* 100	$3220/8163=39.4\%$	$4688/7095*100=66\%$	$5559/7663*100=73\%$	$5514/7649*100=73\%$	$5046/7679*100=66\%$	$5668/8177*100=69.3\%$
Positividad de Baciloscopia	Numero de SR + a la BK / No. de SR examinados con BK de esputo. * 100	$31/3220=0.10\%$	$34/4688*100=0.72\%$	$27/5559*100=0.49\%$	$42/5514*100=0.76\%$	$10/5046*100=0.198\%$	$31/5668*100=0.54$
Concentración de la BK	No de BK realizadas para Dx / No de SR examinados	$8163/3220=2.5$	$12015/4688=2.5$	$14376/5559=2.59$	$14.183/5.514=2.6$	$12747/5046=2.52$	$14468/5668=2.5$

TUBERCULOSIS

A pesar de los avances tecnológicos, el mejoramiento de la calidad de vida y el mayor acceso a los servicios de salud, la Tuberculosis continua siendo un problema de salud pública a nivel global con cerca de :

• 9.000.000 de casos nuevos.

• 1.500.000 de muertos cada año

• En el 2006 en Colombia se reportaron 11.122 casos de Tb, de los cuales 10.696 fueron nuevos , para una tasa de incidencia de 24 por 100.000 habitantes.

Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



TUBERCULOSIS

En el año 2011 en Colombia

• Se presentaron 11500 casos nuevos.

• 200 casos nuevos en Nariño.

• 55 casos nuevos en el Municipio de Pasto

• Pasto 2013 47 casos

• Pasto 2014 08 casos

Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



ALCALDÍA DE PASTO

TUBERCULOSIS

La prevención y control de la Tb ha sido históricamente prioritaria en los programas de salud Pública del País, así por ejemplo desde la expedición de la resolución 412 de 2000 .

En la cumbre del milenio y el documento Conpes Social No 91 de 2005, se atiende la necesidad de fortalecer dichas actividades, procedimientos e intervenciones en la prioridad de Tb.

Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



LINEAMIENTOS DE TUBERCULOSIS Y LEPRA 2013

OBJETIVO

Disminuir la morbi-mortalidad por Tuberculosis en el Departamento

METAS DE RESULTADO

Mantenida la curación de casos de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva superior **88** %

META DE PRODUCTO ANUAL

Mantenida la Captación de sintomáticos respiratorios por encima del **96%**
Garantizar el tratamiento TAES al 100% de los pacientes diagnosticados

Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.




TUBERCULOSIS

TUBERCULOSIS

Es una enfermedad
infectocontagiosa
bacteriana Tuberculosis –
TBC- TB, Tisis

- ROBERTO KOCH
Bacilo de Koch
1882




Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



- Diversas manifestaciones clínicas.
- Pulmones órganos más comúnmente afectados
 - Riñones
 - Huesos
 - Ganglios linfáticos
 - S.N.C.
 - Órganos genitales
 - Diseminación hematológica




Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



CADENA EPIDEMIOLOGICA

- **AGENTE CAUSAL: BAAR.**
 - Micobacteria del complejo mycobacterium.
 - M. tuberculosis
- **MODO DE TRANSMISIÓN:**
 - Vía aérea.
- **PERIODO DE INCUBACIÓN:**
 - Varía entre 2 y 12 semanas.
 - 10% desarrolla la enfermedad
 - VIH(+) 50 % de desarrollarla.
- **SUSCEPTIBILIDAD:**
 - Universal para todas las edades y sexo.



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



ALCALDÍA DE PASTO

FACTORES DE RIESGO

- Desnutrición
- Hacinamiento
- Malas Condiciones Higiénicas
- Infección por VIH
- Drogadicción Indigencia
- Diabetes
- Estrés- alcoholismo
- Falta de Inmunización



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



ALCALDÍA DE PASTO

*La Búsqueda Pasiva de los
Sintomáticos Respiratorios
(Tos y/o Expectoración +15d)
es una labor Fundamental
en la Detección de Casos*



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.


Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



ALCALDÍA DE PASTO

AYUDAS DIAGNOSTICAS

- CLINICO
- EPIDEMIOLOGICO
- RADIOLOGIA
- HISTOPATOLOGIA
- TEST DE ADA
- TUBERCULINA




Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



Recolección de Muestras en S.R.



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



ALCALDÍA DE PASTO



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.





Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



ALCALDÍA DE PASTO

EN NIÑOS NO EXPECTORAN

Es necesario hospitalizarlo para practicar el lavado gástrico:

Se pasa una sonda nasogástrica la noche anterior, fijándola y marcando el punto de fijación, a las 5 am sin despertar al niño, con jeringa se aspira el contenido gástrico, el cual se deposita en un frasco estéril con fosfato trisódico al 10%, en proporción de 2 ml por 10 ml de muestra.

Instalar por la sonda 50 ml de agua destilada estéril, aspirar nuevamente y colocar en el mismo envase y enviarlo rápidamente al laboratorio para bacilos copia y cultivo.

Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.





Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



RESULTADO PRUEBA DE TUBERCULINA

Si es igual o mayor a 10mm = (positivo).
Personas con VIH + - SIDA igual o mayor 0,5mm =
(positivo)

Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



CONTROL MEDICO (2,4,6 mes)



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



ALCALDÍA DE PASTO

CONTROL DE ENFERMERIA (1,3,5)



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



CONTROL BACTERIOLOGICO (2,4,6 mes)



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



TUBERCULOSIS

COMO INGRESA UN PACIENTE

- *NUEVO
- *RECAIDA
- *REINGRESO DE ABANDONO
- *TRANSFERIDO



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



TUBERCULOSIS

COMO EGRESA UN PACIENTE

- CURADO
- TERMINADO
- FRACASO
- ABANDONO
- TRANSFERIDO
- FALLECIDO



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



TUBERCULOSIS

1. Strengthen basic TB control
DOTS on the ground + patient support = cure



Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



i

QUIMIOPROFILAXIS

Se realiza administrando Isoniazida durante seis (6) meses en dosis de 10 miligramos por kilo de peso/día, a contactos menores de 5 años con reacción

tuberculina. de 10 ó mas milímetros, no vacunados y a quienes se les haya descartado previamente la

Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.



QUIMIOPROFILAXIS

Además, a aquellos adultos que se encuentran inmunodeprimidos o inmunosuprimidos y tengan tuberculina positiva, se administra isoniazida a dosis de 300 mg/día por 6- 9 meses

Terminemos con la Tuberculosis, diagnóstico
y tratamiento para todos.

Pasto Libre de Tuberculosis 2014.





ALCALDÍA DE PASTO

Esp. ALEXANDER CAICEDO MARTINEZ
Coordinador de Tuberculosis y Lepra
Secretaria Municipal de Salud
alexcaicedom@hotmail.com
723 9456 Extensión 19 Salud Publica