

ACETAMINOFEN

Recomendaciones de uso seguro

El Invima se permite recordar que todos los medicamentos se deben consumir de acuerdo a las instrucciones dadas por los profesionales de la salud autorizados o a la información de comercialización del Invima cuando corresponda, para evitar eventos adversos o intoxicaciones en los pacientes.



LO QUE DEBES SABER SOBRE EL ACETAMINOFEN O PARACETAMOL

El acetaminofén pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos (que alivian el dolor) y antipiréticos (reducen la fiebre).



Contraindicaciones del Acetaminofén:

Este producto está contraindicado en personas con historial previo de hipersensibilidad al Acetaminofén o a los excipientes



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS



No usar con otros productos que contengan acetaminofén. El uso concomitante con otros productos que contienen acetaminofén puede conducir a una sobredosis.

- La sobredosis de acetaminofén puede causar falla hepática, la cual puede requerir trasplante de hígado o conducir a la muerte.
- Una enfermedad hepática existente incrementa el riesgo de daño hepático relacionado con el acetaminofén. Pacientes con diagnóstico previo de insuficiencia hepática o renal, deben consultar con el médico antes de tomar este medicamento.
- Casos de disfunción/falla hepática han sido reportados en pacientes con deficiencia en los niveles de glutatión; como aquellos con desnutrición severa, anoréxicos, con bajo índice de masa corporal, grandes consumidores crónicos de alcohol o que tienen sepsis.
- En pacientes con estados de deficiencia de glutatión, el uso de acetaminofén puede incrementar el riesgo de acidosis metabólica.
- Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
- Mantenga el producto fuera del alcance y la vista de los niños



SOBREDOSIS POR ACETAMINOFEN



La sobredosis de Acetaminofén puede causar falla hepática que puede requerir trasplante de hígado o conducir a la muerte. Se ha observado pancreatitis aguda usualmente con disfunción y toxicidad hepática. En el caso de una sobredosis se requiere manejo médico inmediato, así no se encuentren presentes síntomas de sobredosificación, debido al riesgo de daño hepático retardado.


DOSIS MAXIMA RECOMENDADA

Niños:

La dosis debe ser de máximo **10 mg/Kg cada 4 a 6 horas, o 15mg/Kg por toma, sin superar los 60mg/Kg por día.**

Adultos:

Se ratifica como dosis máxima: **500 mg cada 4 a 6 horas.**



EFFECTOS SECUNDARIOS

Informe a su médico si cualquiera de estos efectos aparece, se vuelve grave o no desaparece: náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor de cabeza, agitación, dificultad para dormir y para permanecer dormido



Referencias

INVIMA. Sistema de Trámites en Línea Consultas Públicas [Internet]. [cited 2018 Nov. 15]. Available from: <https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/ACETAMINOFEN.pdf>
Medicamentos a un clic [Internet]. [cited 2018 Nov. 15]. Available from: <http://www.medicamentosau clic.gov.co/Consultas/frmBusquedas.aspx?idPpio=frmBusquedasIfrm.aspx?idPpio=5>

Proyectó: Ana Sibaja Sibaja - Q.F Farmacovigilancia, Noviembre de 2018